

# Risiko

## WAS IST BEI ASPLENIE ZU BEACHTEN?

**Asplenie bedeutet, dass die Milz fehlt oder nicht funktioniert.**

Pro Jahr wird bei ca. 8.000 Menschen in Deutschland die Milz operativ entfernt (Splenektomie). Schätzungen ergaben, dass ungefähr einer von tausend Bundesbürgern keine Milz hat. Hinzu kommen Erkrankungen, bei denen die Funktion der Milz eingeschränkt ist. Patienten mit Asplenie haben ein erhöhtes Risiko, an Infektionen zu erkranken, die durch Erreger der Hirnhaut- oder Lungenentzündung wie Pneumokokken, Meningokokken oder Haemophilus influenzae ausgelöst werden. Häufig verlaufen bei diesen Patienten die Infektionen besonders schwer.

Eine Impfung gegen die genannten Erreger ist eine wichtige Maßnahme zum Schutz von Asplenie-Patienten.

Patienten mit Asplenie sollten stets einen Notfallpass mit sich führen. Weitere Informationen rund um Asplenie und die aktuellen Impfeempfehlungen finden Sie auf der Internetseite der [Initiative Asplenie-Net](#). Dort können Sie auch den genannten Notfallpass kostenfrei bestellen.